

Všetko, čo potrebujete vedieť skôr, ako navštívite vášho lekára

[REGISTROVAŤ / PRIHLÁSIŤ SA](#)

Dôležité! Prečítajte si poučenie a informovaný súhlas pred očkovaním vakcínou Comirnaty proti COVID-19 v ambulancii vášho všeobecného lekára alebo pediatra / [Otázky a odpovede](#)

Aktualizované ku dňu: 07.07.2021

Vhodnosť očkovania sa posudzuje individuálne podľa zdravotného stavu pacienta.

Túto časť si prosím prečítajte veľmi pozorne. Lekár Vám tieto riziká vysvetlí aj osobne a pokiaľ niečomu nerozumiete, tak sa ho na nejasnosti neváhajte okamžite opýtať.

Očkovanie **nie je možné vykonať, ak ste precitlivení na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok**. Pomocnými látkami očkovacej látky Comirnaty sú:

- ((4-hydroxybutyl)azánciyl)bis(hexán-6,1-diyl)bis(2-hexyldekanoát) (ALC-0315),
- 2-[(polyetylénglykol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamid (ALC-0159),
- 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfochofín (DSPC),
- cholesterol,
- chlorid draselný,
- dihydrogenfosforečnan draselný,
- chlorid sodný,
- dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného,
- sacharóza,
- voda na injekcie.

Je veľmi dôležité, aby ste pred podpisom tohoto súhlasu informovali svojho lekára alebo zdravotnú sestru, ak:

- ste niekedy v minulosti **mali závažnú alergickú reakciu alebo problémy s dýchaním po inej injekcii alebo po podaní Comirnaty** (ak u pacienta vznikla po prvej dávke očkovacej látky Comirnaty anafylaktická reakcia, nemá sa mu podať druhá dávka tejto očkovacej látky),
- ste niekedy **po injekcii ihlou odpadli**,
- **máte závažné ochorenie** (onkologické, kožné, alergologické, imunitné, pľúcne ochorenie, neurologické, kardiologické, reumatické, poruchy zrážania krvi) a došlo ku jeho zhoršeniu, alebo ste boli liečení kortikoidmi, biologickou liečbou dostávali ste liečbu na posilnenie imunity alebo utlmenie imunity,
- **máte infekciu s vysokou horúčkou** (viac ako 38 st. C),
- **máte problém spôsobujúci krvácanie**, ľahko sa vám tvoria modriny alebo používate liek na prevenciu tvorby krvných zrazenín,
- **máte oslabený imunitný systém**, napríklad z dôvodu ochorenia ako je infekcia HIV alebo užívate lieky ako sú kortikosteroidy, ktoré ovplyvňujú váš imunitný systém.

Mierna zvýšená telesná teplota (37-38 st. C) alebo infekcia horných dýchacích ciest (ako napríklad prechladnutie) očkovaniu nebránia.

Napriek tomu lekára aj o týchto zdravotných problémoch pred očkovaním informujte!

Tehotenstvo a očkovanie vakcínou Comirnaty: Sú iba obmedzené skúsenosti s podaním očkovacej látky Comirnaty tehotným ženám. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky z hľadiska tehotenstva, embryofetálneho vývoja (vývoja počas tehotenstva), pôrodu alebo postnatálneho vývoja (vývoja po pôrode). Podanie očkovacej látky počas tehotenstva je však potrebné zvažovať len v prípade, ak možné prínosy prevažujú nad akýmikoľvek možnými rizikami. **O svojom tehotenstve pred podpisom tohoto súhlasu (pred očkovaním) informujte svojho lekára a ten s Vami v nadväznosti na Vaše tehotenstvo, Váš zdravotný stav a ďalšie súvislosti prekonzultuje prínosy a riziká očkovania, na základe čoho sa bude môcť lepšie rozhodnúť.**

Dojčenie a očkovanie vakcínou Comirnaty: Nie je známe, či sa Comirnaty vylučuje do materského mlieka a teda ani, či nemá vplyv na dojčené dieťa, nakoľko sa klinické skúšanie na dojčiacich ženách nevykonávalo. **O dojčení pred podpisom tohto informovaného súhlasu (pred očkovaním) informujte svojho lekára a ten s Vami v nadväznosti na Vaše dojčenie, Váš zdravotný stav a zdravotný stav Vášho dieťaťa a ďalšie súvislosti prekonzultuje prínosy a riziká očkovania, na základe čoho sa bude môcť lepšie rozhodnúť.**

Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie pripravila dokument, v ktorom sa venuje práve otázke vplyvu vakcín proti ochoreniu COVID-19 na tehotné a dojčiace ženy. V dokumente poukazujú na skutočnosť, že **vzhľadom na to, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 patria do kategórie neživých vakcín, nepredstavujú žiadne riziko pre tehotnú ženu, pre dojčiacu ženu ani jej dieťa** (dokument dostupný [tu](#)).

Fertilita (plodnosť) a očkovanie vakcínou Comirnaty: Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky z hľadiska reprodukčnej toxicity a zatiaľ neexistujú údaje o tom, že by očkovanie malo mať plodnosť očkovanej osoby negatívny (škodlivý) vplyv.

Pred vykonaním očkovania a podpisom tohto informovaného súhlasu je potrebné, aby ste vyplnili Anamnestický dotazník, ktorý Vám lekár predloží. Je dôležité, aby ste v dotazníku uviedli pravdivé údaje, aby lekár mohol objektívne zhodnotiť Váš zdravotný stav a či podanie očkovacej látky vo Vašom prípade nepredstavuje prípadné riziko.

Nenašli ste odpoveď, ktorú ste hľadali?

Napíšte nám na office@medius.sk

Po návšteve Vášho lekára sa zastavte na www.podakuj.sk

Chcete sa o tomto projekte **dozvedieť viac?**

ÁNO, SOM ZVEDAVÝ

Prevádzkovateľom webu Ambulancia.online je:

Komora pre medicínske právo - MEDIUS / Mäsiarska 6, 04001 Košice / 0948 342 800 / office@medius.sk